ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

KZ.16.01.98.002.E.000625.09.22 от 9 сентября 2022 года

Продукция: Дезинфицирующее средство (антисептик) "Протаргол 2% спрей ФАРМНОВАЦИЯ". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-002-06657161-2017. (Далее согласно приложению)

Изготовитель (**Производитель**): ООО "ФАРМНОВАЦИЯ", 446116, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Клиническая, дом 2, оф. 3, Российская Федерация

Заявитель: ООО "ФАРМНОВАЦИЯ", 446116, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Клиническая, дом 2, оф. 3, Российская Федерация

Соответствует: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Реш КТС от 28.05.2010 г. № 299.

Свидетельство выдано на основании: Протокол испытаний РГП на ПХВ "КНЦКЗИ им. М. Айкимбаева" КООЗ МЗ РК № 104 от 24.05.2017 г., экспертное заключение РГП на ПХВ "КНЦКЗИ им. М. Айкимбаева" КООЗ МЗ РК № 17/554 от 01.06.2017 г. Выдан взамен №KZ.16.01.95.002.E.000815.10.17 от 03.10.2017 г.

Срок действия: Не ограничен

Председатель
Н. Садвакасов

М. П.

№ 0000402

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

о государственной регистрации продукции

09 сентября 2022 года KZ.16.01.98.002.E.000625.09.22

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
В лечебно-профилактических учреждениях для антисептической обработки рук медицинского персонала. Как профилактическое антисептическое средство для применения населением (в том числе для детей от 3-х лет) в виде распылений, впрыскиваний или аппликаций. Средство обладает бактерицидной активностью в отношении бактерий. Протеинат серебра диссоциирует с образованием ионов серебра, которые оказывают вяжущее, антисептическое действие. Ионы серебра активно подавляет возбудителей инфекций, связывая их ДНК. Меры предосторожности: использовать для наружного применения. После вскрытия хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. По истечении срока годности использование средство запрещается. Перед применением небольшое количество средства нанести на локтевой сгиб для выявления индивидуальной непереносимости. При возникновении индивидуальной непереносимости (раздражение, жжение, зуд) промыть место нанесения водой и отказаться от применения. Не применять во время беременности и в период грудного вскармливания. При случайном попадании средства в желудок рекомендуется выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (например, 10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться за врачебной помощью. Хранение и транспортирование: Хранить в плотно закрытой упаковке производителя при температуре от +2 до +25°С; вдали от источников тепла и возгорания; избегать хранения на прямом солнечном свете. Хранить отдельно от лекарств, в местах недоступных детям,не применять через тридцать дней после вскрытия. Форма выпуска: Во флаконы полимерные или стеклянные по 10, 15, 20, 40, 50, 100 мл укупоренные дозатором-распылителем. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 2 года со дня изготовления. 0,2, 0,3, 0,4, 1, 2 г протеината серебра в резервуар-крышку из полиэтилена, вода очищенная 10, 15, 20, 40, 50, 100 мл во флакон стеклянный или полимерный. Дополнительно комплектуется дозатором-распылителем. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 2 года со дня изготовления.

Председатель
Н. Садвакасов

М.П.

№ 0000402