АО "Красногорсклекресредства"
143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25
Тел./факс: , тел.:+7 (495) 705-93-71
Сайт: https://www.krls.ru, e-mail: sales@krls.ru

ПАСПОРТ № ГПМ00000424

Шиповника плоды низковитаминные 50 г.

Номер серии **380826** Дата производства **14.08.2026**
Количество в серии, шт **20 956**
Годен до **31.07.2028**
Пробу отобрал **Кривошеева Н. В.**
Анализ выполнен по **ЛП-№(012034)-(РГ-RU)-081025**

№	Наименование показателя	Требования НД	Результаты испытаний
1	Внешние признаки	Цельные, очищенные от чашелистиков и плодоножек ложные плоды разнообразной формы: шаровидной, сплюснуто-шаровидной, яйцевидной, овальной или продолговатой; длина плодов 0,8-2,5 см, диаметр 0,7-1,7 см. Цвет плодов от оранжево-красного до коричневато-красного, темно-коричневого, орешки светло-желтые, иногда коричневатые. Плоды состоят из разросшегося мясистого, при созревании сочного цветоложа (гипантия) и заключенных в его полости многочисленных плодиков-орешков. На верхушке плода имеется небольшое круглое отверстие или пятиугольная площадка. Стенки высушенных плодов твердые, хрупкие, наружная поверхность блестящая, реже матовая, более или менее морщинистая. Внутри плоды обильно выстланы длинными, очень жесткими щетинистыми волосками. Орешки мелкие, продолговатые, со слабо выраженными гранями. Запах отсутствует.	Соответствуют
2	Микроскопические признаки	Должны соответствовать НД	Соответствуют
3	Определение основных групп биологически активных веществ	На хроматограмме испытуемого раствора после обработки дифенилборной кислоты аминоэтилового эфира раствором 1 % в спирте 96 % и макрогола 400 раствором спиртовым 5 % в УФ-свете (365 нм) должны обнаруживаться следующие зоны адсорбции: зона зеленовато-желтого, желтого или оранжево-желтого цвета на уровне зоны СО гиперозида, зона желтого или зеленовато-желтого цвета выше уровня зоны СО гиперозида, зона зеленого или желто-зеленого цвета выше уровня зоны СО гиперозида; допускается обнаружение дополнительных зон адсорбции.	Подтверждены
4	Влажность, % не более	15	13
5	Зола общая, % не более	6	3,7
6	Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте, % не более	1	0,2
7	Измельченных частиц плодов, в т. ч. орешков, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 3 мм, % не более	3	0,2
8	Другие части шиповника (кусочки веточек, чашелистиков и плодоножек),% не более	5	0,2
9	Пригоревшие, поврежденные вредителями и болезнями плоды, % не более	10	7,1
10	Органическая примесь, % не более	0,5	0,1
11	Минеральная примесь, % не более	0,5	0,1
12	Свинец, мг/кг, не более	6,0	Соответствует
13	Кадмий, мг/кг, не более	1,0	Соответствует
14	Ртуть, мг/кг, не более	0,1	Соответствует
15	Мышьяк, мг/кг, не более	0,5	Соответствует
16	Зараженность вредителями запасов	Не допускается	Не обнаружено
17	Масса содержимого упаковки	50 г ± 7,5 %	Соответствует
18	Общее число аэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г, не более	50 000 000	12 000
19	Общее число дрожжевых и плесневых грибов, КОЕ в 1 г, не более	500 000	6 000
20	Escherichia coli, КОЕ в 1 г, не более	100	менее 10
21	Бактерии рода Salmonella в 25 г	Не допускаются	Не обнаружено

22	Свободные органические кислоты, % не менее	2,6	4,4

Анализ содержания радионуклидов проводится в лекарственном растительном сырье, используемом для производства лекарственного препарата.

Заключение: **Отвечает требованиям ЛП-№(012034)-(РГ-RU)-081025**

Начальник ОКК **Азаренкова Е. С.** 24.09.2026